



Plazminojen Aktivatör İnhibitör -1 antijen

Gebelik sırasında plazmadaki plazminojen aktivatör inhibitör-1 antijen konsantrasyonunda yükselme meydana geldiği bildirilmektedir.

- (↑) 56 gebe üzerinde yapılan değerlendirmede, plazma plazminojen konsantrasyonunun gestasyon yaşı ile pozitif korelasyon gösterdiği ($r=0.79$); hiçbir gebede referans aralığının altında netice elde edilmediği, gebelerin %64.3'ünde elde edilen ölçüm neticelerinin referans aralık sınırları üzerinde bulunduğu bildirilmiştir.

Blood coagulation and fibrinolysis during normal pregnancy. Van Wersch JWJ, Ubachs JMH. Eur J Clin Chem Biochem 1991;29:45-50.

- (↑) 40'tan fazla hasta üzerinde yapılan değerlendirmede 10. haftada ortalama konsantrasyon $6.1 \pm 3.5 \mu\text{g/L}$, 38. haftada $37.3 \pm 18.4 \mu\text{g/L}$ bulunmasına karşın, gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubunda ortalama konsantrasyonun $5.6 \pm 7.5 \mu\text{g/L}$ olduğu bildirilmiştir.

Fibrinolytic components in individual consecutive plasma samples. Lindoff C, Lecander I, Astedt B. Fibrinolysis 1993;7:190-194.